

京都文教大学 2016年秋学期
宇宙の科学

担当教員：磯部洋明
京都大学大学院総合生存学館 准教授
京都文教大学・非常勤講師
第3回「様々な天体」

2016年10月10日

今日の話

- 電磁波って？
- 宇宙の様々な天体
- 星の一生


宇宙(天体)から届くもの

- 電磁波
- 粒子
 - 宇宙線(高エネルギーの陽子や鉄イオンなど)、ニュートリノなど
- 重力波
 - 2015年について初検出

問題：電磁波って何？


電磁波=電気と磁気の波

- 電磁石:コイルに電流を流すと磁場ができる
 - 電=>磁
- 電磁誘導:コイルに磁石を近づけると電流が流れる
 - 磁=>電



電場が磁場を作り、磁場が電場を作り、その電場がまた磁場を作り、、、と伝わってゆく。これを電磁波と呼び、その伝わる速さを光速と呼ぶ

目に見える光(可視光)も電磁波の一種




1nm(ナノメートル)=10億分の1メートル

From wikipedia commons


色を感じるメカニズム

- 眼の中には青、緑、赤に感度の高い3種類のセンサー(視細胞)がある
- 3つのセンサーが感じる光の相対的な強さで、脳が色を判断する
- センサーを一つしか持たなければ、世界は白黒




様々な波長で見た太陽

電波



可視連続光



1992 June 07



H α 線(水素の出す赤い光)




紫外線




X線

物体はその温度に応じた電磁波を出している




宇宙全体~270度=>電波




人や動物~40度=>赤外線

1992 June 07



太陽表面~6000度=>可視光




太陽コロナ~100万度=>X線

問題1: 温度って何？

- 80度のサウナに入れるのに、80度のお湯には入れない理由を考えてみてください

様々な天体

惑星




- 自分では光らず、恒星の周りを回る星
- 岩石(水、金、地、火)、ガス(木、土)、氷(天、海)などでできている
- 太陽系以外でも見つかっている(詳細は後日)

恒星

- 太陽のように自ら光る星
- エネルギー源は核融合
- 夜空に見える星はほとんどが恒星

1992 June 07



星の色の違い＝温度の違い



レグルス しし座の1等星
30cm反射望遠鏡 (f=1650mm) Fujichrome400 5min.exp. 1984 Feb.10 No.3392

津村光則（和歌山市）




アルクトゥールス オレンジ色に輝くうし座の1等星
30cm反射望遠鏡 (f=1650mm) Fujichrome400 3.5min.exp. 1984 Feb.10 No.3393

津村光則（和歌山市）

青っぽい...温度が高い
(1万～数万度)

赤っぽい...温度が低い
(約4000度)

星の色(温度)と大きさは質量だけで決まる (主系列星の場合)



重くて大きい=>青っぽく、温度が高い
軽くて小さい=>赤っぽく、温度が低い


ヘルツシュフルング・ラッセル図(HR図)

明るさ

主系列星：
水素の核融
合により光
る恒星。


赤色巨星：
死ぬ直前に
赤く膨れ上
がった星

白色矮星：
主系列星が
死んだ後に
残る小さくて
熱い星



白色矮星(はくしょくわいせい)

From wikipedia commons



すざくが発見した白色矮星
(JAXA/ISAS)


太陽程度の質量の星が寿命を迎えると、星の外層が流れてて惑星状星雲を作り、最後に小さくて密度の高い星が残る。
=>白色矮星

中性子星

質量が太陽の数倍程度の星
が最後に超新星爆発を起こ
し、後に残る星。

全て中性子でできた、巨大な
原子核。半径10km程度。

重力むちゃくちや強い。人が
中性子星の上に降り立つたら、
重力で立っておられず、人の
形もしておられず、かつてそ
の人を構成していた粒子が
薄い膜になって星の表面を覆
う(たぶん)




想像図(NASA)


© 2008 Sky & Telescope: Gregg Dinderman

ブラックホール

- ・重力が強すぎて光すらも出てこられなくなった領域。
- ・太陽の8倍以上重い星が死んだ後にできる。
- ・銀河中心にも巨大なブラックホールがある



天の川(銀河系の中心方向)の手前にブラックホールを「置いて見た」ら、周囲の時空が歪んでこんな風に見えるはず、という図



連星(お互いの周りを回る星)の一つがブラックホールになると、相方の星からガスがブラックホールに落ち込み、その時解放されるエネルギーがX線などを出して観測される。

問題2

- ・「星の数ほど多い」というが、(我々に見ることのできる)宇宙の中に星はいくつあるか？

星の集団

銀河 約1000億個の星の集団



球状星団(数10万個の星の集団)



散開星団(数100程度の星の集団)

典型的な銀河の形

橿円銀河



M 87 (NGC 4486)

Ultra-high-sensitivity HDTV I.I. color camera (NHK)
Exp. 8 sec. (8 frames coadded) January 16, 1999



Subaru Telescope, National Astronomical Observatory of Japan
Copyright © 1999, National Astronomical Observatory of Japan, all rights reserved.

NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team



不規則銀河



渦巻き銀河
銀河系はこのタイプ

NASA/JPL-Caltech/SSC

さまざまな形の銀河 (Hubble)






さまざまな形の銀河 (Hubble)

問題1の答え

- 温度=物質を構成している分子の平均の運動エネルギー(速さ)
- 温度が高い物質(B)は、分子が速く動き回っている。温度が低い物質(A)は、分子がゆっくり動いている
- エネルギーの高い(=速い)粒子が当たると痛い=熱い



サウナとお湯の違いは、密度=分子の数の違い。

サウナは1日1発ビンタされて、お湯は1秒間に100発ビンタされるようなもの(*)。1発で受けるダメージは一緒だが、数が全然違う。

*実際には、空気と水の密度差は1000倍くらい。

問題2の答え

- ・ 銀河一つの中に星は大体 100000000000 個($=10^{11}$ 個)
- ・ 我々が見ることのできる宇宙全体に銀河は大体
 100000000000 個($=10^{11}$ 個)から 1000000000000 個(10^{12} 個)
- ・ 従って星の数は $10000000000000000000000000000000$ 個くらい
(ゼロの数で ± 1 個位の不確定性はある)
- ・ 水を一口飲むと、その中に入っている水分子の数は宇宙の星の数と大体同じくらい。