

京都精華大学 2012年前期

自然科学論

担当教員：磯部洋明

京都大学宇宙総合学研究ユニット・特定講師

京都精華大学・非常勤講師

第6回「放射線」


第6回 2012年5月15日

今日の話


- 原子、原子核とは？
- 放射線とは？
- なぜ放射線は人体に悪いのか？

物質は原子からできている


- 水分子(H₂O)は、水素原子Hが2つ、酸素原子Oが1つからできている
- 分子(原子)がしっかり結びついているのが**固体**、くっついているけどお互いに動き回れるのが**液体**、自由に飛び回っているのが**気体**



水分子



原子は原子核と電子からできている



- 電子はマイナスの電気を持っている
- 原子核は、プラスの電気を持つ陽子と、電気を持たない中性子からできている
- 原子の種類は陽子の数で決まる(同位体の区別は後述)

原子(元素)の種類(周期表)

1 H																	18 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	*1	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	*2	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo

*1 ランタノイド:

57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

*2 アクチノイド:



89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr
----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

有名どころを書いとくと


元素記号	なまえ	陽子の数(原子番号)
H	水素	1
He	ヘリウム	2
C	炭素	6
N	窒素	7
O	酸素	8
Fe	鉄	26
Cs	セシウム	55
Au	金	79

全ての「物質」はこれらの原子(元素)の 組み合わせでできる

エタノール(アルコールの一種)分子は
炭素Cが2つ、酸素Oが1つ、水素Hが6つ




食塩(塩化ナトリウム)は
ナトリウムNaと塩素Clがずらつ
と並んで結晶になっている



生命のDNAは、水素H、炭素C、酸素O、
窒素N、リンPがずらつと並んでできている

「化学反応」とは原子の組み合わせを変えること

核反応：原子核がくっついたり壊れたりすること



軽い(小さい)2つの原子核がくっつく
= **核融合**

重い(大きい)原子核が分裂する
= **核分裂**

(分裂せずに電子等を放出して違う
原子核に変わる反応(ベータ崩壊)もある)

核融合や核分裂が起きると、莫大なエネルギーが放出される
(エネルギー放出しないような核反応は特殊な場合を除いてそもそも起きない)

ほとんど全ての元素は宇宙でできた

宇宙ができたとき(ビッグバン)、宇宙には

水素(陽子1つ)



ヘリウム(陽子2つ、中性子2つ)


と




しかなかった(リチウムもほんの少しだけあったらしい)

- それ以外の元素は全て、星の内部で、又は星が大爆発(超新星爆発)する時の核反応で作られた
- だから、皆さんの身体を作っている原子のほとんどは、太陽系が生まれる前に他の星の中で作られたもの

太陽のエネルギー源は、 水素の核融合



水素原子核4つ




ヘリウム原子核1つ

- 炭素、酸素、窒素、鉄など、他の様々な元素も星の内部で作られる
(エネルギー源としては水素の核融合が圧倒的に大きい)
- 水素爆弾のエネルギーはこれ。発電に使う研究も長年行われているが、実現していない

核分裂：原子爆弾、原子力発電所の原理

- 核分裂＝大きな原子核が分裂すること



(爆弾や原子力発電所で使われる核分裂にはこれ以外の反応もあるが、連鎖反応のメカニズムは似ている)

同位体とは、中性子の数が違う原子核

- 元素の種類(=化学的性質)は、陽子の数で決まる
- 陽子と中性子の重さはほぼ同じ。電子はとても軽い。
=>原子の重さは陽子と中性子の数で決まる
- 例えば炭素(陽子6つ)には以下の3つの同位体がある
 - 陽子6個、中性子6個の炭素12
 - 陽子6個、中性子7個の炭素13
 - 陽子6個、中性子8個の炭素14
- 同じ元素でも、核反応の起こしやすさは、同位体によって(=中性子の数によって)異なる。
- ヨウ素はほとんどが陽子53個、中性子74個のヨウ素127だが、原子炉内でできるヨウ素131(陽子53個、中性子78個)はベータ崩壊により放射線を出す



さっきまでの復習

- 物質は全ての原子からできている
- 原子は原子核と電子からできている
- 原子核がくっついたり分裂したりして、原子の種類が変わることを「核反応」という
- ここからは、「核反応」の時にでる「放射線」の話
をします


放射線とは： 高いエネルギーを持った粒子や電磁波のこと

いろいろ種類がある

アルファ線
(ヘリウム原子核)



ベータ線
(電子・陽電子)




ガンマ線
エネルギーの高い電磁波
(これより少しエネルギーが小さいのがエックス線)


これ以外にも中性子線、重粒子線など色々ある。とにかくエネルギーが高いもの。

「エネルギーが高い」の意味(太陽を例に)

太陽からやってくる光



太陽からやってくる放射線



- 太陽からは光も放射線もやってくる
- 太陽光はピンポン球が1億個飛んでくるようなもの。一つ一つのエネルギーは大したことないが、数が多いので全体としてはエネルギー大。
- 放射線はゴルフボールが2,3個飛んでくるようなもの。全体としては大したことないが、一つ一つのエネルギーが大きいので当たるとダメージがある


核反応が起きると放射線が出る

- 「不安定な」同位体は、核反応を起こして他の元素に変わる。この時、余分なエネルギーを放射線として出す
- ヨウ素131 \Rightarrow キセノン131 + ベータ線 + ガンマ線
- セシウム137 \Rightarrow バリウム137 + ベータ線 + ガンマ線
- 同じヨウ素やセシウムでも、自然界に多く存在するヨウ素127やセシウム133は安定で、放射線を出さない

放射能とは：**放射線**を出す**能力**のこと



普通のヨウ素(ほとんどヨウ素127)は
放射線をほとんど出さない
=放射能が小さい



放射性同位体であるヨウ素131がたくさん
含まれると、放射線を出す
=放射能が大きい

放射能の大きさ=1秒間にどれくらい放射線を出しているか
=> これが**ベクレル**という単位の意味

「単位」ってとても大事

- わたしの体重は50キログラムです
 - あなたの年齢は50歳です
 - ...さて、どっちが大きいですか？
 - 数字の示す意味が違うものを比べても意味がありません
-
- わたしの体重は50キログラムです
 - ひよこの体重は50グラムです
 - ミジンコの体重は50ミリグラム(注: 適当です)
 - 数字だけでなく単位もみないと量は分かりません

ミリシーベルト？ マイクロシーベルト？

- ペタ P (1,000,000,000,000,000 = 1000兆倍)
- テラ T (1,000,000,000,000 = 1兆倍)
- ギガ G (1,000,000,000 = 10億倍)
- メガ M (1,000,000 = 100万倍)
- キロ K (1,000倍)
-
- ミリ m (1/1000)
- マイクロ μ (1/1,000,000 = 100万分の1)
- ナノ n (1/1,000,000,000 = 10億分の1)
- ピコ p (1/1000,000,000,000 = 1兆分の1)

1シーベルト = 1000ミリシーベルト = 100万マイクロシーベルト

放射線と放射能の単位

- **ベクレル(Bq)＝放射線をどれだけ出すか(放射能)**
 - 1秒間に1個放射線を出すのが1 Bq
 - 例: 1kgあたり100Bqの水が1kgあれば、1秒間に100個、10kgあれば、1秒間に1000個の放射線が出る
 - 放射線の種類、エネルギーには関係ない

放射線と放射能の単位


- グレイ(Gy) = 放射線のエネルギーを吸収した量
 - 1kgあたり1ジュール(~0.24カロリー)吸収したら、1Gy
 - 放射線の種類には関係ない
 - (ニュース等にはあまり登場しない)
- シーベルト(Sv) = 吸収(被ばく)した放射線の人体への影響を示す量
 - 大雑把には、グレイと同じ意味
 - 「人体への影響」を示すため、吸収したエネルギーが一緒でも、放射線の種類や臓器ごとに違う値になる
 - 例えばガンマ線、ベータ線は1Gy=1Sv、アルファ線は1Gy=20Sv

μSv と $\mu\text{Sv}/\text{h}$ の違い

- マイクロシーベルト μSv は「トータルで浴びた量」
 - 以下、ミリシーベルト mSv でもシーベルト Sv でも同じ
- 「ある場所の放射線量」としてよく使われるのはマイクロシーベルト毎時($\mu\text{Sv}/\text{h}$)。一時間その場所にいたら、何 μSv 被ばくするか、ということ
 - $10\mu\text{Sv}$ の場所に10時間いたら、 $100\mu\text{Sv}$ の被ばく
 - 距離50kmと、速度50km/hの関係に似ている
- ニュース等でも「毎時」が省略されていることがあるので注意
 - 最近はずすがに減ったが、原発事故直後はこの間違いがなかなか直らなかった

半減期とは？

- 放射能が半分になるのにかかる時間のこと
- 半減期が8日のヨウ素131なら、8日経つと半分、16日経つと1/4になる
- 半減期が30年のセシウム137は、30年でようやく半分になる




- 「半減期が長い＝なかなか放射線を出さない」なので、長ければ怖いというわけでは必ずしもない。
- 例えばインジウム115の半減期は数百兆年。つまり、事実上放射線はほとんど出さない

自然界にも放射線はある

ラドン、ウラン、カリウム40など、自然界に存在する放射性同位体や、宇宙から来る放射線(宇宙線)からの被ばくがある



宇宙から0.4 mSv



大地から0.5 mSv



ラドンから1.2 mSv



食物から0.3 mSv


実は人間の身体も放射線を出している(体内のカリウム40から)。体重60kgの人で、7000ベクレルくらい。

放射線医学総合研究所のHPより

日常生活での被ばく



- 胸部レントゲン撮影やCTスキャン
- ラドン温泉や飛行機(上空)など自然放射線が多い場所
- 少量の被ばくは常にしているので、そもそも「被ばくゼロ」にするのは無理(被ばくしないにこしたことはない)

図: Newton 2008年10月号より
<http://www.newtonpress.co.jp/newton/radiation/html/radiation.html>



太陽フレアから来る放射線

太陽フレアの紫外線像。右の図で画面が乱れているのは、フレアで発生した放射線が紫外線用のCCDカメラをヒットしているため(人工衛星TRACEが撮影)



太陽からの放射線は地上には届かないが、この時宇宙飛行士が船外活動をしていると、致死量の被ばくになり得る

外部被ばくと内部被ばく

- 外部被ばく＝放射線を浴びること
- 内部被ばく＝放射性物質（放射能を持つ物質）を身体に取り込むこと
- 内部被ばくの場合、放射性物質の種類により、身体の特定の場所に蓄積することがあり、その場合危険度が高い
 - － 例：ヨウ素が甲状腺にたまる

とにかくこれくらいは、覚えておきましょう1

せん のう —放射線と放射能—


せん 放射線

- ・テレビの電波のような目に見えない光。
または、速くて遠くまで飛ぶ、すごく小さな粒のこと。



のう 放射能

- ・放射線を出す力。
- ・力のもとは、モノ。
- ・やっぱり目に見えない。



Concept & Text by Fuji Nagami, Design & Illustration by Miho Kuriki © Sendai Visual Art × Science Partnership

<http://www2.atword.jp/science/> より

とにかくこれくらいは、覚えておきましょう2

ベクレル...放射線がどれくらい出ているか


シーベルト...どれだけ人体に影響があるか

自然界にも放射線はあり、日常生活を送っていても年間2ミリシーベルトほどの被ばくはしている

放射線の人体への影響

Star-Forming Region in the Carina Nebula  HUBBLEST

なぜ放射線は身体に悪いのか？



答え：細胞を傷つけるから

放射線が直接DNAなどを傷つける場合と、一旦水を電離させることで傷つける場合がある

図：Newton 2008年10月号より

<http://www.newtonpress.co.jp/newton/radiation/html/radiation.html>

DNAが傷つくとどうなる？

- DNAは「細胞が何をすることが書かれたプログラム」
- プログラムが壊されるとどうなる？
 1. 細胞に備わる修復機能が働いて治る
 - この場合なんの影響もない
 2. 細胞が死んでしまう
 - 大量の被ばくにより一度に大量に起きると大変。少しずつなら問題ない
 3. 本来と違う、悪い働きをする細胞になってしまう
 - これがどんどん増殖するのが「がん」

放射線の影響には2種類ある

- **確定的影響**

- 一定量($\sim 0.5\text{Sv}$)以上を短期間に被ばくすると、確実に症状がでる

- **確率的影響**

- 比較的少ない被ばく($\sim 0.1\text{Sv}$)でも、将来ガンになる可能性が上がる

生物は放射線によるDNA損傷を修復する機能を持っている。少量の被ばくで影響が大きく出ないのはそのため。だがどれくらい少なければ絶対影響がない、とはっきり言うことはいまのところでできない。

確定的影響

表. X線またはガンマ線を一時に全身に受けた時の症状.

被ばく線量 (シーベルト)	早期影響の症状	備考
0.25	ほとんど臨床症状なし	
0.5	リンパ球一時的減少	
1.0	吐き気、嘔吐、全身倦怠 リンパ球著しく減少	
1.5	放射線宿酔 50%	放射線をあびた結果、二日酔いに似た症状が現われるのを放射線宿酔という
2.0	長期白血球減少	
4.0	死亡 30日間に50%*	この線量を50%致死線量という
6.0	死亡 14日間に90%*	
7.0	死亡 100%*	

*治療しない場合


出典:「放射能と人体」(研成社)

確率的影響

100mSvごとにガンで死亡する確率が0.5%増える

100mSv以下の被ばくの影響はよく分かっていない（ないとは言い切れないが、あっても小さいため検出が困難）

放射線によるがん・白血病の増加



「確率的リスク」に向き合うのは難しい

- 全体から見れば「わずかな」確率の上昇
- だが、一人一人にとってみれば「ガンになるかならないか」
- 「絶対に安全」を期すのは現実的とは言えない。実際はリスクとコストを天秤にかけざるを得ない
 - 例えば、交通事故を無くすために、車を全廃できるか？
- 可能性は低いが、起きてしまえば結果は重大というリスクにどう向きあうべきか...(飛行機事故、原発事故)

来週は「科学と社会」をテーマにこんな話をします

- 原子力発電の仕組みについて
- 低レベル放射線の健康への影響、ないという専門家とあるという専門家がいるけど？
- 政府、東電、メディアは本当のことを言ってる？
- 誰の言う事を信じたらいい？

アンケート設問

1. 原子力発電所や放射線のことについて、誰の言う事が比較的**信頼できる**と思いましたが？
(政府、東電、科学者、TV、新聞、ネットの情報、直接の知り合いetc...)
2. 原子力発電所や放射線のことについて、誰の言う事が比較的**信頼できない**と思いましたが？
(政府、東電、科学者、TV、新聞、ネットの情報、直接の知り合いetc...)
3. 今日の授業の感想、質問