基礎宇宙物理学 II : 電磁流体力学 レポート 9

この授業に関するページ : <http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~tamazawa/lecture/astrophysics2.html>

1. われわれの声は衝撃波になるまでの時間 τ と、距離 L を計算せよ。ただし、散逸はないものとし、音波の電波は一次元的であるとする。音波の強さを $I = \rho(\delta v)^2 c_s = 10^{-6} [W/m^2]$ 、空気の音速を $c_s = 300 [m/s]$ 、密度を $\rho = 1 [kg/m^3]$ 、声の周波数を $300 [Hz]$ とする。ここで、 δv は音波の振幅である。

ただし、衝撃波が形成されるまでの時間、距離は次のように決まる。

$$\tau = \frac{\lambda}{4\delta v} \tag{1}$$

$$L = c_s \tau = \frac{\lambda c_s}{4\delta v} \tag{2}$$

ここで、 λ は音波の波長である。

2. 前問と同じ条件で、音の強さだけを変えたとき、東京で発した音波がイタリア・ローマで衝撃波となる音の強さを dB で答えよ。ただし、東京-ローマ間の距離は $10^4 [km]$ とする。音の強さは $10 \log_{10} I/I_0 [dB]$ で定義され、 $I_0 = 10^{-12} [W/m^2]$

図 1: さまざまな音のレベル (理科年表 2013 年 WEB 版より)